

## **Отзыв на автореферат диссертации Деминой А.Г.**

### **Особенности течения диабетической нейроостеоартропатии Шарко и эффективность её консервативного лечения, представленной на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.02 – эндокринология**

Диабетическая нейроостеоартропатия Шарко является одним из самых малоизученных и недооцениваемых медицинским сообществом проявлением синдрома диабетической стопы. Развитие несовместимых с ходьбой деформаций стопы, высокий риск развития язвенного дефекта и ампутации, длительная нетрудоспособность и, в большинстве случаев – инвалидизация пациента характеризуют эту патологию как весьма серьёзную и социально значимую. К сожалению, до сих пор в патогенезе и течении артропатии Шарко остаются белые пятна, что приводит к ошибкам в диагностике и лечении. Поэтому диссертационная работа Анастасии Геннадьевны Деминой, посвящённая изучению ряда клинических аспектов артропатии Шарко, является актуальной как в теоретическом, так и в практическом плане.

Исследование А.Г. Деминой вносит существенный вклад в понимание таких важных аспектов артропатии Шарко как её распространенность, факторов, определяющих эффективность лечения активной стадии, закономерностей динамики формы стопы в неактивную стадию, а также роли пациента в судьбе поражённой конечности.

В работе впервые в отечественной амбулаторной популяции пациентов с нейроостеоартропатией Шарко изучены причины низкой приверженности к лечению, предикторы длительности иммобилизации, проведено сравнение эффективности разных способов иммобилизации. Новые научные данные получены и при анализе результатов компьютерной педографии при многолетнем наблюдении, которые при сопоставлении с данными радиоизотопных исследований позволили автору сделать предположение о причинах изменений формы стопы в неактивную стадию артропатии.

Очевидна также и практическая значимость диссертации, так как результаты работы являются основой для внедрения в практику не только самих методик, применённых автором, но и ряда организационных мер, которые показали свою эффективность в ходе исследования, а практические рекомендации могут быть с лёгкостью распространены в лечебных учреждениях.

Достоверность результатов обеспечена репрезентативностью обследованных групп пациентов, а также адекватными методами статистического анализа. Цель исследования, поставленная диссертантом, достигнута путём последовательного решения задач исследования. Выводы, практические рекомендации являются обоснованными и в полной мере отражают основные результаты работы.

Материалы исследования в достаточной степени были представлены на общероссийских и международных конгрессах и отражены в печати, в том

